

麦 作

小麦の収穫後の圃場管理

北海道農政部生産振興局 技術普及課 十勝農業試験場駐在

主任普及指導員 池田 勲 (農業革新支援専門員)

小麦収穫後の圃場に残される麦稈は、比較的容易に持ち出すことができる有機質資源であり、たい肥化し、土づくり資材として活用することが望まれる。また、小麦収穫後は降雪までに数ヶ月の期間があるため、後作緑肥の栽培や透排水性改善のための心土破碎や傾斜均平を行うなど、土づくりに取り組む絶好の時期である。

1 麦稈の利用

秋まき小麦の麦稈生産量は、子実収量の約1.5倍である。例えば、子実収量600kg/10aとすると、麦稈生産量は900kg/10a程度になる。麦稈に含まれる成分は、炭素(C)が約45%、窒素が約0.4%、リン酸が約0.1%、カリが約2%である。

C/N比が100以上と高く、そのまま鋤き込むと作物に窒素飢餓(有機物分解に伴い施肥窒素が微生物に取り込まれ、作物が窒素不足になること)を招く(表2)。

C/N比：有機質資材に含まれる炭素量を窒素量で割った値で、土壤に施用されたときの分解・窒素放出の速さの目安。
炭素率が高いほど分解・放出が遅い

麦稈のすき込みによる窒素飢餓を回避するためには、麦稈を可能な限り持ち出し、たい肥化によってC/N比を適度に低下させてから圃場に還元することが望ましい。そうすることで、条斑病・立枯病・眼紋病など土壤病害の発生圃場では被害の拡大を軽減することができる。

また、地域内の畜産農家と麦稈とたい肥の交換は、耕畜連携による土づくりの観点から積極的に進めたい。

以下には、麦稈の圃場への還元方法別に対応のポイントを示す。

(1) たい肥化

たい肥化のポイントは、麦稈を分解する微生物が働きやすいように、養分・水分・空気などの環境を整えることにある。まずは、C/N比30程度を目安に窒素添加することで、たい肥化が早く進む。添加する窒素は、肥料よりも家畜ふん尿が望ましく、家畜の敷料として利用するか、家畜ふん尿と混ぜ合わせてからたい肥化する。家畜ふん尿の入手が困難な場合には、麦稈100kg当たり窒素成分で1kg程度(硫安・石灰窒素では約5kg、尿素では約2kg)を添加する。

また、水分環境を好適にするために、水分を60~70%程度に調整(ふん尿を利用しない場合は麦稈重量の2倍程度の水を加える)する。堆積期間中も1~2ヶ月毎に繰り返し、空気に触れさせるとともに、乾いている場合は水分を補給する。

たい肥を圃場に施用した際には、放出される養分量を推定し、次作物の施肥量を調節する。畑地に牛ふん麦稈たい肥を施用した場合には、現物1t当たり窒素で約1kg、リン酸



写真1 小麦収穫後のたい肥投入

で約 3 kg、カリで約 4 kgが減肥可能量の目安となる (表 1)。

たい肥を秋施用する場合は、硝酸態窒素の流亡に伴う地下水汚染を避けるため、地温が低下する10月中旬以降とし、散布後耕起することが望ましい。

(2) すき込み

作業等の都合から、麦稈の持ち出しが困難な場合がある。このような場合はすき込みを行う。

また、刈り取られた麦稈がすべて持ち出さ

れたとしても、刈り高さの麦稈は圃場に残される。

すき込まれた麦稈が年内に分解する割合は、最大30%程度である。そのため、麦稈すき込み時に、C/N比調整を目的に窒素肥料を施用しても、かなりの部分は秋期の降雨や融雪水によって下層に流亡すると想定される。

したがって、麦稈すき込みによる窒素飢餓を回避するためには、次作物に対する窒素増肥や後作緑肥の栽培が合理的である。

麦稈すき込み時の次作物に対する窒素増肥、

表 1 牛ふん麦稈たい肥の肥効率と減肥可能量

後作物	施用期間	乾物率 (%)	成分量 (kg/現物 1t)			肥料換算係数 (%、化学肥料=1)			減肥可能量 (kg/現物 1t)		
			T-N	P2O5	K2O	T-N	P2O5	K2O	N	P2O5	K2O
畑作物	単年～連用 4 年まで	30	5.0	5.0	4.0	0.2	0.6	1	1.0	3.0	4.0
	連用 5～9 年								2.0	3.0	4.0
	連用10年～								3.0	3.0	4.0

- 注 1 ここでのたい肥は、牛ふん麦稈たい肥であり、原料成分、混合割合により減肥可能量は変動する。
- 注 2 牛ふん麦稈堆肥のりん酸肥効率は、従来20%程度とされていたが、現在は60%と変更になった。
(「有機物の肥効評価と局所施用を活用した畑作物・野菜に対するリン酸減肥指針」(平成25年普及推進)より)
- 注 3 土壌診断に基づく窒素施肥対応を行う際には、たい肥を5年以上連用している場合でも、単年施用の減肥可能量を用いる。
- 注 4 作物の品質低下、倒伏及び硝酸態窒素の流亡を考慮し、単年度の施用量の上限を5t/10a程度、連用条件における上限は3t/10a程度とする。
- 注 5 初期生育を確保するために、基肥窒素施肥量を各作物のスターター窒素(秋まき小麦で2kg/10a、春まき小麦で3kg/10a、ばれいしょで2～3kg/10a、てんさいで4kg/10a、菜豆で2kg/10aなど)以下にしない。

【出典】「北海道施肥ガイド2015」(2015年 道農政部)を一部改変

表 2 麦稈生産量と施肥対応方針

作物	処理法	標準的乾物量 (kg/10a)	すき込み時 C/N比 (参考)	減肥可能量 (kg/10a)	
				N	K2O
秋まき小麦	全量すき込み	600～900	80～100	-3～-5	7～10
	搬出残量	300～450		-2～-3	4～5
春まき小麦	全量すき込み	500～700	60～80	-2～-3	10～12
	搬出残量	250～400		-1～-2	5～6

- 注 1 麦稈における搬出残量とは、コンバイン刈取り高さ(約40cm)以下の部分を指す。
- 注 2 麦稈はC/N比が高いため、すき込み翌年に窒素飢餓が生じる危険が大きい。このため、麦類跡地に緑肥作物を導入してC/N調整を行うことが望ましい。
- 注 3 麦稈をC/N調整せずにすき込んだ場合、てんさいに対する翌年の窒素施肥は減肥可能量欄におけるマイナス分を、ばれいしょはこの半量を増肥する。豆類は増肥しないで必要に応じて追肥する。
- 注 4 カリの減肥は土壌の交換性カリが土壌診断基準値以上の際に実施する。
但し、てんさい、ばれいしょを作付する場合は基準値内でも減肥する。

【出典】「北海道施肥ガイド2015」(2015年 道農政部)を一部改変

カリ減肥指針を表 2 に示したので、次作物の作付けにあたっては減肥可能量を参考にする。

2 後作緑肥の導入

小麦収穫後に栽培される後作緑肥には、えん麦・えん麦野生種（ハイオーツなど）・ヘアリーベッチ・シロカラシ（キカラシ）・ひまわりなどがある（表 3）。

たい肥と同様、地力維持・向上などの土づくり効果が期待できるほか、圃場状況や翌年の作付作物に応じた適切な種類を選択することで、土壤病害の軽減、有害センチュウの抑制、雑草抑制、環境保全など多様な効果が期待できる。一方、特定の病害を助長することもある（表 4）。

緑肥後作物としては、えん麦には豆類（特に大豆）、えん麦野生種には根菜類・豆類（特に小豆）・てんさい、ヘアリーベッチ後

にはマメ科以外、シロカラシにはてんさい・ばれいしょ・小麦・菜豆、ひまわり後にはとうもろこし・小麦・たまねぎが適するとされる。

緑肥の効果を十分に発揮させるには、秋まき小麦収穫後のできるだけ早い時期に播種を行うことが重要である。播種遅れに伴う生育量の減少程度は、大きい順に、ひまわり>シロカラシ>えん麦>ヘアリーベッチである。遅れると生育量を十分に確保することが難しくなる。特にひまわりは早生品種の作付や早期播種を行わないと開花に至らず、景観緑肥としての効果のみならず、後作物のリン酸吸収を高める働きを持つ菌根菌を増加させる効果が十分に発揮されない。

緑肥の生育量を確保するためには窒素施肥が有効で、特に麦稈のすき込み量が多い場合はやや多めに施肥する。えん麦、シロカシは

表 3 主な後作緑肥作物の栽培利用指針

作物名	地域	時期（月／旬）		は種量 (kg/10a)	乾物収量 (kg/10a)	C/N比
		は種	すき込み			
えん麦	全道	～8／中	10／中～下	15～20	400～800	15～25
えん麦野生種	全道	～8／中	10／中～下	10～20	400～600	15～25
ヘアリーベッチ	全道	～8／中	10／中～下	5	150～300	10～15
シロカラシ	全道	～8／下	10／中～下	2	350～550	12～20
ひまわり	道央・道南 道東・道北	～8／下 ～8／中	10／中～下	1.5～2.0	200～500 100～400	10～20

【出典】「北海道緑肥作物等栽培利用指針（改訂版）」（2004年、道農政部、一部改変）

表 4 緑肥の効果

作物名	科名	効						果					
		有機物供給	窒素効果	物理性改善	透水性改善	キタネガレセンチュウ	キタネコブセンチュウ	菌根菌	病害	雑草抑制	土壌浸食防止	養分流亡防止	農村景観保持
えん麦	イネ科	◎	○	○		×	◎	○	注2	○	○	○	
えん麦野生種	イネ科	◎	○	○		◎	◎	○	注2	○	○	○	
ヘアリーベッチ	マメ科		◎			×	×	◎		◎	○		
シロカラシ	アブラナ科	○	○	○		×	×		注2		○	○	◎
ひまわり	キク科	◎		◎	○	×	×	◎	注2		○	○	◎

注 1 ◎：非常に効果がある、○：効果がある、×：センチュウを増やす。

注 2 えん麦はジャガイモそうか病に効果がある。えん麦野生種はジャガイモそうか病、小豆落葉病に効果がある。シロカラシはジャガイモそうか病、根こぶ病を助長する。

ひまわりは半身萎凋病を発生を助長する恐れがある（抵抗性品種の作付が望ましい）。

注 3 雑草抑制効果は十分な生育量が前提となる。

注 4 品種の詳細な特性等は種苗会社のカタログ等を参照する。

【出典】「北海道緑肥作物等栽培利用指針（改訂版）」（2004年、道農政部、一部変更）



写真2 後作緑肥（シロカラシ類）



写真3 後作緑肥（ひまわり）

4～8 kg/10a、ひまわりは4～6 kg/10a、ヘアリーベッチは2～5 kg/10aが目安となる。

リン酸施肥は、えん麦・ヘアリーベッチ・シロカラシで5～10kg/10a、ひまわりで8～10kg/10aが目安であり、土壤診断基準値（有効態リン酸10～30mg/100g）を下回る圃場では効果が高い。また、カリ施肥は、土壤診断基準値（交換性カリ15mg/100g）以上あれば省略可能だが、下回る場合は、5～10kg/10a程度を施用する。

緑肥のすき込みは、10月中～下旬が適期であるが、土壤が過湿で練り返しが懸念される場合や、次年度の作付予定が豆類など播種期の遅い作物の場合は、翌春すき込みを考慮する。なお、春すき込みの場合は、緑肥の野良生え、雑草化に留意するとともに、後作物の出芽や初期生育に障害を生じさせないために、

播種の2～3週間前にすき込んでおく。

すき込み方法は、生育量が少ない場合やC/N比が低く分解の早い緑肥ではプラウで直接すき込むことが可能である。生育量が多く、C/N比が高い場合は、分解促進のため、ストローチョッパーで細断するか、ロータリーやデスクハロー等により表層土壌と混和してからプラウですき込む。

たい肥や麦稈すき込みの場合と同様に、緑肥をすき込んだ際にも、放出される養分を見込んだ施肥対応が必要である。小麦収穫後に後作緑肥を栽培した場合の窒素減肥可能量は、緑肥から放出される窒素と麦稈のすき込み量から設定する（表5）。麦稈持ち出し圃場でえん麦（C/N=20と仮定）400kg/10a（乾物）すき込みの場合の窒素減肥可能量は1.5 kg/10aとなる。

緑肥の含まれるカリは肥効が高く、土壤交

表5 緑肥を小麦跡地に導入した場合の後作物の窒素減肥可能量

(単位：kg/10a)

麦稈処理 (すき込み量)	緑肥の C/N比	緑肥の乾物重 (kg/10a)			
		200	400	600	800
持ち出し (200kg/10a)	10	3.5	8.0	13.0	—
	15	1.5	3.5	6.0	8.5
	20	0	1.5	2.5	3.5
全量すき込み (800kg/10a)	10	1.0	5.0	9.0	—
	15	0	1.5	3.5	—
	20	0	0	1.0	—

注1 緑肥のC/N比は、えん麦で15～25、ヘアリーベッチで10～15、シロカラシで12～20、ひまわりで15～20が目安である。

注2 初期生育を確保するために、基肥窒素施肥量をてんさいで4 kg/10a、ばれいしょで2～3 kg/10a、菜豆で2 kg/10a程度以下にしない。

【出典】「北海道緑肥作物等栽培利用指針（改訂版）」（2004年、道農政部、一部改変）

表 6 緑肥すき込みに伴う後作へのカリ減肥対応

土壌診断区分	交換性カリ (mg/100g)	施肥対応
基準値以下	15未満	緑肥に含まれるカリは減肥しない
基準値	15~30	緑肥へのカリ施肥量の80%を評価して減肥する
基準値以上	30以上	緑肥に含まれるカリの80%を評価して減肥する

※ 後作がてんさい・ばれいしょの場合は基準値内でも、緑肥に含まれるカリ含量の80%を減肥する。

【出典】「北海道緑肥作物等栽培利用指針（改訂版）」（2004年、道農政部、一部改変）

換性カリ含量に応じて減肥を実施する（表6）。緑肥乾物100kg中のカリ含有量は、えん麦で4kg、ヘアリーベッチ・シロカラシで5kg、ひまわりで3kg程度である。

3 土壌物理性の改善

農業機械の大型化に伴い、作土層直下に耕盤層が形成されやすい状況にある。耕盤層は根の伸長を阻害するのみならず、透排水性を低下させることで湿害を助長し、作物の生育、収量を低下させる。

心土破碎など補助暗きよの施工は、耕盤層対策および排水対策に有効であり、小麦収穫後の土壌条件が良好な時期を選んで施工する

ことによって、より高い効果が期待できる。

補助暗きよは多様であり、農業者が自ら実施可能なものとして、心土破碎、広幅型心土破碎、有材心土破碎（モミガラ暗きよ）、弾丸暗きよ、穿孔暗きよなどがある。

また、その効果は、心土破碎に代表される耕盤層対策、排水対策を主目的とした穿孔暗きよなど、工法、機種によって多様である。目的とする効果を得るには、圃場の状態を十分に把握し、目的にあった工法、機種を選択する必要がある（表7）。

作物生育を阻害する耕盤層は、プラウ耕起深直下に見られる場合が多く、山中式土壌硬度計で硬度20mm以上、貫入式土壌硬度計

表 7 補助暗きよの工法と期待される効果の程度（目安）

工法	耕盤層対策	排水対策	商品名の例
心土破碎	○~◎	△~○	サブソイラ・バラソイラ
広幅型心土破碎	◎	○	プラソイラ・ソイルリフター ハーフソイラ
有材心土破碎 （モミガラ暗渠等）	◎	◎	モミサブロー
弾丸暗きよ	○	○	
穿孔暗きよ	-	◎	ポストホールディガ

注1 効果の程度として大きい順に◎>○>△で示した。

注2 商品名の例を挙げたが、心土破碎、広幅型心土破碎、弾丸暗きよは、施工部の形状が多様であり、示した効果の程度は、機種により変動がある。

「補助暗きよのポイント」

- ・ほ場の状態を把握し、目的にあった工法、機種を選択しましょう。
- ・心土破碎などは、ほ場が乾いた時に、できるだけゆっくりと施工しましょう。
- ・広幅型心土破碎は、機種によって表層に下層土を混入するものがあるので注意しましょう。
- ・どの工法も、暗きよが施工されていることが必要です。
- ・暗きよと直交するように施工しましょう。
- ・有材心土破碎以外の施工効果は短期的です。状況によっては毎年の施工が必要です。

(コーンペネトロメーター)で1.5MPa以上の場合には、心土破碎などの耕盤層対策が望まれる。また、圃場を50cm程度掘って土壌断面を観察し、「赤い鉄さび色の斑紋がある」、「青白い斑紋(グライ斑)がありドブ臭い」、「泥炭層がある」などの場合は排水対策が有効となる場合が多い。

なお、本来補助暗きょは土壌中の余剰水を排水するためのもので、暗きょ整備済み又は下層の透排水性が良好な圃場での適用が望まれる(下層の排水悪く圃場に凹部がある場合、補助暗きょを通して水が溜まる恐れがあるので注意が必要)。

近年、簡易な無材暗きょとしてカッティングドレーン工法、心土改良機能を有し排水持続効果の高いカッティングソイラー工法等が



写真4 カットドレーン施工

低コスト工法として導入された。

特に前者については農業者が所有するトラクタでも施工可能な作業機としてカットドレーン(写真4)が開発され注目されている。