

＜訂正とお詫び＞

リーフレット（平成 25 年 8 月 小麦 NO.5）

秋まき小麦播種安定確収の決定版

良穂確保は適期適量播種で決まる！

(1) 2 ページ（赤字数字を訂正）

● 茎の出現時期別の収量性および草姿


圃場	茎の出現時期	葉数 (枚)	1穂子実重 (g/穂)	1穂粒数 (粒/穂)	千粒重 (g)	稈長 (cm)	穂長 (cm)
A	越冬前頑健茎	5以上	2.33	52.5	44.3	72.7	9.0
	越冬前針茎	4	1.56	35.1	44.4	68.1	8.1
	越冬後出現茎	3	1.34	30.5	43.5	61.8	7.3
B	越冬前頑健茎	5以上	1.80	43.8	40.8	73.2	8.5
	越冬前針茎	4	1.08	27.0	40.0	68.1	7.2
	越冬後出現茎	3	—	—	—	—	—

※葉数は、輪ゴム設置時(5月10日頃)の葉数

① : 4 以上→正 : 5 以上

(2) 3 ページ（赤字文字・ローマ数字を訂正）

● 越冬前主茎葉数ごとの草姿と頑健茎(「きたほなみ」)



越冬前の主茎葉数別頑健基本数(枠囲が頑健茎と判断された茎)

※25株の平均値。分けつ出現以降、毎日観察により調査した。

※記号「p」は、プロフィール節から出現した分けつ。

※本調査における分けつの出現順序は、I号、II号、I p、III号、II p、I-1、IV号・I ppの順で出現した。

※5.5葉時のIII号分けつは1枚以下だが、茎の形状が明らかに頑健であるため頑健茎と判断した。

①誤：収量→正：生育量

②誤：II号→正：III号

以上のように訂正します。